Guselkumab en Pioderma Gangrenoso perianal en paciente con cáncer de recto metastásico asociado al uso de crema ANSO: a propósito de un caso

Miguel Leal Mérida, Elisabeth Gómez Moyano, Alejandro Arroyo Córdoba, Daniel Jesús Godoy Díaz, Leandro Martínez Pilar.
Dermatología. Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga - España

INTRODUCCIÓN

- El **pioderma gangrenoso (PG)** es una dermatosis neutrofílica infrecuente caracterizada por úlceras dolorosas de origen idiopático. Su **patogenia** es autoinmunitaria, destacando el **fenómeno de patergia**.
- El **diagnóstico** es de **exclusión**, exigiendo correlación clínico-histológica, y su **manejo** es complejo. **Guselkumab** se ha propuesto como tratamiento en **PG refractario** (aún no aprobado en esta indicación).

CASO CLÍNICO

- Varón de 57 años, **antecedente de adenocarcinoma de recto metastásico** tratado con quimioterapia
- **Úlceras perianales dolorosas** (Fig 1), de **evolución tórpida** pese a terapias antimicrobianas y corticoides tópicos (Fig 2).
- Refería **uso crónico de crema ANSO**.

- **Biopsias:** descartaron neoplasia e infecciones (PCR Leishmania, hongos, micobacterias negativas). **Cultivo microbiológico:** *S. aureus* y *E. faecalis*, (contaminantes).

- **Última biopsia:** úlcera con inflamación crónica reagudizada y necrosis, sin neoplasia; **compatible con PG**.

- Inicio de **prednisona 1mg/kg/día**, con **mejoría parcial**, pero rápido desarrollo de miopatía esteroidea.
- Se solicitó a farmacia hospitalaria **Guselkumab fuera de ficha técnica** a dosis de 100mg s.c, con reducción de tejido de granulación y avance de epitelización (Fig 3).
- **Reducción progresiva de prednisona sin recidiva** (Fig 4) y en seguimiento, sin necesidad de otros inmunosupresores.

Fig.1: Úlceras por ANSO

Fig.2: Retirada de ANSO + inicio ácido fusídico

Guselkumab

Fig.3: Tras 1ª dosis de Guselkumab, mejoría significativa

Fig.4: Reducción de prednisona, buen control

DISCUSIÓN

- Cáncer colorrectal:** tumor digestivo más frecuentemente asociado a **PG**. Se han descrito **úlceras perianales** con la aplicación crónica de la **crema ANSO** (4). Y, por **fenómeno de patergia**, originar un **PG**.
- Guselkumab** actúa **inhibiendo la IL-23**. Concretamente, **IL-23A**, que está incrementada en el **tejido afecto**.
- En conclusión, **Guselkumab** puede ser una **alternativa muy eficaz y segura** en caso de **PG resistentes**, ampliándose así el perfil de pacientes en los que podría emplearse, e incluyendo a **pacientes oncológicos**, donde otros inmunosupresores supondrían mayor riesgo.